

Participant Name (Please Print): _____

Anticonceptivo Subdermal Implante HOJA DE DATOS

El implante es un anticonceptivo subdermal del tamaño de un cerillo. Este es una varilla de plástico delgada y flexible que es colocada bajo la piel de su brazo por parte de un proveedor de servicios médicos y que puede prevenir un embarazo por hasta tres años.

El implante funciona al prevenir el embarazo por medio de la liberación de una dosis pequeña continua de la hormona llamada etonogestrel. Etonogestrel es un tipo de la hormona progesterona, la cual las mujeres tienen naturalmente. Esta hormona previene que el huevo sea liberado del ovario, también espesa el moco cervical para prevenir que la esperma alcance el huevo.

El implante es uno de los métodos más efectivos de anticoncepción disponible, más del 99%.

El implante no protege en contra de las enfermedades de transmisión sexual (ETSs). Los condones son la mejor forma para las personas sexualmente activas para reducir el riesgo de una infección. Siempre utilice un condón si usted o su pareja tienen otras parejas sexuales.

Colocación del implante:

El implante es colocado en la oficina de su proveedor de servicios médicos. El implante solamente debe de ser colocado cuando usted y su proveedor estén completamente seguros de que no está actualmente embarazada. Una área en la parte superior del brazo será limpiada y el área será inyectada con una medicina para adormecer (lidocaine). El implante será colocado justo debajo de la piel en su brazo. Ambos usted y su proveedor deberán poder sentir el implante después de la colocación.

Retiración del Implante:

El implante es retirado en la oficina de su proveedor. Su proveedor sentirá la colocación de la varilla. Después de inyectar el área con medicina para adormecer (lidocaine), se hará una pequeña incisión sobre la orilla del implante y el implante será retirado. Si su proveedor de servicios médicos no puede sentir el implante, puede que necesite que se le hagan unos exámenes de imagen (ultrasonido o MRI) para localizar el implante antes de que sea retirado.

Ventajas del Implante:

- Dura por hasta 3 años
- Forma más efectiva de anticoncepción
- Puede ser usado cuando se está lactando
- Funciona rápidamente después de la colocación
- No se necesita hacer nada antes de tener relaciones sexuales
- Puede quedar embarazada rápidamente después de ser retirado el implante

Posibles desventajas del implante:

- Comunes
 - La mayoría de las mujeres tienen sangrado y mancha menstrual irregular cuando usan el implante. Puede que algunas mujeres dejen de tener periodos menstruales.
- Poco común
 - Dolor o cicatrización en el área de la colocación
 - Puede tener un pequeño aumento de peso
 - Dolor de cabeza, acné, quistes ovarios o cambio en el estado de ánimo

Riesgos de usar el implante:

- **Infección** – Es posible pero raro obtener una infección por medio de la colocación del implante.
- **Embarazo** – Es poco común que quede embarazada cuando tenga el implante. Si usted queda embarazada el implante debe de ser retirado. No hay evidencia de que el implante causa defectos de nacimiento.
- **Migración del implante** – muy raramente un implante puede moverse un poco en el brazo.

El implante no puede ser usado por mujeres que:

- Estén o crean que están embarazadas
- Tengan una alergia a la hormona etonogestrel
- Tengan un historial de cáncer de seno
- Que tengan sangrado vaginal sin causa

Dígale a su clínico si tiene alguno de estos factores de riesgo o condiciones o si está en tratamiento para alguna enfermedad médica. El implante puede que sea menos efectivo para algunas mujeres usando anticonvulsivos (anticonvulsivo) o medicamentos anti-retrovirales.

Señales de alerta – por favor llame al su proveedor de servicios médicos inmediatamente si:

- Nota rojez, inflamación o dolor no usual en el área de la colocación del implante.
- Pieza que está embarazada
- Si fue o cree que ha sido expuesta a una ETS (enfermedad de transmisión sexual)
- Tiene sangrado inusualmente fuerte de la vagina

Instrucciones para después de la colocación

- Deje la cinta o curita cubriendo el área de la herida por 2-3 días
- Puede quitarse el vendaje compresivo y la gasa 24 horas después de la inserción
- Moretones y molestias leves son comunes después de la inserción

Exámenes físicos médicos de rutina y de las ETS y detección del cáncer son muy recomendables.

Firma del paciente: _____ Fecha: _____

Firma del doctor: _____ Fecha: _____